

**Widłaczek torfowy *Lycopodiella inundata*  
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej**

Marsh club moss *Lycopodiella inundata* in the Orava-Nowy Targ Basin

ANNA KOCZUR

*Instytut Ochrony Przyrody PAN  
31–120 Kraków, al. Mickiewicza 33  
e-mail: koczur@iop.krakow.pl*

**Słowa kluczowe:** *Lycopodiella inundata*, rozmieszczenie, eksploatacja torfu, Karpaty, Kotlina Orawsko-Nowotarska.

Widłaczek torfowy *Lycopodiella inundata* (L.) Holub wyginął na wszystkich stanowiskach podawanych z terenu polskich Karpat w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Ponownie odnaleziono go w Karpatach polskich w 2004 roku na terenie Bieszczadów Zachodnich, a obecnie również na torfowisku Puścizna Wielka w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Nowe stanowisko znajduje się na terenie kopalni torfu, a rosnąca tu populacja jest niewielka. Nowo odkryte stanowisko jest młode. Do jego powstania mogła się przyczynić prowadzona tu eksploatacja, gdyż obecnie gatunek ten pojawia się głównie na siedliskach antropogenicznych.